

රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ජීව විවිධත්වය සහ ප්‍රාග් ඓතිහාසික වැදගත්කම



BDS
BIODIVERSITY
SECRETARIAT

ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය



පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශය

රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ
ජීව විවිධත්වය සහ
ප්‍රාග් ඓතිහාසික වැදගත්කම

කැළඹි නලින්ද මනමේන්දු-ආරච්චි*

2007

ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය
පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශය

*වනජීවී පර්යේෂක

වනජීවී උරුම හා පුද්ගලික සමාගම

24, කටුකුරුන්ද වත්ත පාර, රත්මලාන

kelum@slt.lk

රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ පීච විවිධත්වය සහ ප්‍රාග් ඓතිහාසික වැදගත්කම

ප්‍රථම මුද්‍රණය 2007 දෙසැම්බර්

© පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශය

මෙහි ඇතුළත් කිසිදු කරුණක්, පාඨාරූපයක් හෝ රූපයක් කර්තෘගේ ලිඛිත අවසරයක් නොමැතිව උපුටා ගැනීම, පළකිරීම හෝ ප්‍රසිද්ධ කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම්ය.

ISBN 978-955-9120-86-5

කර්තෘ : කැළඹි නලින්ද මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි

රූපණය : කැළඹි නලින්ද මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි

පාඨාරූප : ඇන්ඩ්‍රියස් නොලර්ට් (AN)
මාධව මිහස්කුඹුර (MM)
රාහුල පෙරේරා (RP)
රූපීර් සෝමපීර (RS)
සුදේශ බටුච්චි (SB)
සමන් ලියනගේ (SL)
සුදත් නානායක්කාර (SN)
චිත්‍රකති පීරතුංග (VW)
චන්දිනී උරුම භාර පුද්ගලික සමාගම (WHT)

සොදුපත් බැලීම : එම්. ඒ. නදන් අමන්ද

පිටු සැකසුම හා මුද්‍රණය : කරුණාරත්න සහ පුත්‍රයෝ සමාගම
67, කාර්මික ජනපදය, කටුවාන පාර, හෝමාගම

සම්බන්ධීකරණය : හසුලා චිත්‍රමසිංහ

ප්‍රකාශනය : ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය
පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශය
“සම්පත්පාය”, 82, රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල

පිටි කවරය

කළකර වර්ණ වනාන්තරයක පසුබිමේ දි. Five bar Swordtail (*Pathysa antiphata*) සමනලයෙක් (VW).
Oligospira ගහයේ සේ ගොළුවෙලෙක් (SN), රත්නපුරයෙන් හමු වූ වනාන්ත පොසියෙකු, බලංගොඩ මානවයා හිනි මෙලවීම
සඳහා භාවිත කළ ශිලා මෙවලමක්, ගවරා (*Bos gaurus*) හා බලංගොඩ මානවයා.

පටුන

පෙරවදන	iv
අරමුණ	1
හැඳින්වීම	1
රත්නපුරය හා එ ආශ්‍රිත පීච විවිධත්වය	3
මිරිදිය මසුන්	5
උභයජීවීන්	6
උරගුන්	9
පක්ෂීන්	14
කර්මපායීන්	18
ප්‍රාග් ඓතිහාසික වැදගත්කම	21
කුරැවිට බටදොඹ ලෙන	29
සමාජගීය	36
ස්තූතිය	36

පෙරවදන

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපයත්, දකුණු ඉන්දියාවේ බටහිර ඝාට්ස් කඳු හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපයත් සමස්තයක් ලෙස ගත් කල දකුණු ආසියාවේ ජීව විද්‍යාත්මකව උණුසුම් කලාපයක් ලෙස ජාත්‍යන්තරව පිළිගෙන තිබේ. රත්නපුරය, ශ්‍රී පාද අඩවිය හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපය තෙත් කලාපය මධ්‍යයේ පිහිටි, ජීව විවිධත්වය අතින් අනූන පෙදෙසකි. වළාකුල් වනාන්තර, පහතරට සදාහරිත, නිවර්තන වැසි වනාන්තර, තෘණ බිම්, මිටියාවත්, ගංගා, ඇළ දොළ බහුල මේ කලාපය ආවේණික සත්ව හා ශාක අභිවිශාල ප්‍රමාණයක වාසභූමිය වී තිබේ. තවද ප්ලයිස්ටොසීන හා හොලොසීන සමයන්හි මෙහි විසූ ගවරූන්, සිංහයින්, වනඥයින්, කහවේනුන් ආදී විශාල සතුන්ගේ පොසිල හමුවන නිසා ජාත්‍යාණික විද්‍යාත්මකව ද මේ කලාපයට උරුම වැදගත්කම දෙගුණ තෙගුණ වේ. එපමණක් නොව අදින් වසර 37,000 කට පමණ එපිට මෙහි ජීවත් වූ මෙරට මුල්ම මානවයින්ගේ සැකිලි කොටස් හා ගල් ආයුධ හමුවන ගල් ගුහා හා එළිමහන් ස්ථාන බහුල වන හෙයින් ප්‍රාග් ඓතිහාසික වශයෙන්ද මේ කලාපය අතිශයින් වැදගත් වේ. කෙටියෙන් කිවහොත් මේ කලාපයට අයත්, පෙර කී මානව සාධක බහුලව හමුවන කුරුවිට පිහිටි බටදොඹ ලෙන දකුණු ආසියාවේ වූ වැදගත් ප්‍රාග් මානව වාසස්ථානයක් වේ.

රත්නපුරය, ශ්‍රී පාද අඩවිය හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපයට හිමි මෙකී පාරිසරික, පුරාවිද්‍යාත්මක වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගෙන ඒ කරුණු පිළිබඳ පොදු ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ පෞච්ච විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය මගින් ප්‍රවීණ වනජීවී පර්යේෂකයෙකු වන කැප්මී නලින්ද මනමේන්දු-ආරච්චි මහතා විසින් සම්පාදිත මේ පොත් පිට එළිදක්වා තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් මේ කලාපය පිළිබඳ මානව දැනුමක් පමණක් නොව මෙය රැකගැනීමේ වැදගත්කම ද ජනතාවට එත්තු ගැන්වෙන බව මෙම පොත් පිට කියවීමෙන් පැහැදිලි වේ.

මෙය දැනුම, අවබෝධය තුළින් ජනතාව පාරිසරික සංරක්ෂණය කෙරෙහි යොමු කිරීමට තැබූ වැදගත් පියවරක් බව කිව හැකිය.

ගාමිණී ගමගේ

අධ්‍යක්ෂ

පෞච්ච විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය

පරිසර හා ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශය

අරමුණ

මෙම පොත් පිංච ඔබ අතට පත්කිරීමේ මූලික අරමුණ රත්නපුර පෙදෙසේ වරතමානය හා යටතිසාව පිළිබඳ සංකෂිප්ත දැනුමක් ඔබට ලබාදීමයි. විශේෂයෙන්ම ප්‍රාග් ඓතිහාසිකව ඉතා වැදගත්කමකින් හෙබි මේ පුරවරය සතු අගය අප තවමත් නිසියාකාරව දැන හැඳින්ගෙන නැත. මේ පෙදෙස පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි බසින් ලියවී ඇති වඩාත්ම විද්‍යානුකූල පර්යේෂණ ලිපි හා පොත් පත්වල පළවී ඇති කරුණු සාමාන්‍ය ජනතාවටත්, පාසල් සිසුන්ටත් කියවා තේරුම් ගැනීමට අපහසුය. එපමණක් නොව එම මූලාශ්‍ර සපයා ගැනීමද පහසු නැත. එබැවින් මේ පෙදෙසේ පරිසර විද්‍යාත්මක හා ප්‍රාග් ඓතිහාසික අගය හැකි තරම් සරලව කියාදීම මේ පොත් පිංචේ මූලික අරමුණ වේ. රත්නපුරයේ පිහිටි ජාතික කෞතුකාගාරය මූලික කරගෙන මේ පොත සකසා ඇත. එය නැරඹීමේදී මෙයින් ලැබෙන දැනුම ඔබට වඩාත් පිටිවහලක් වන බව අපගේ විශ්වාසය වේ. ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන්, පරිසර අමාත්‍යාංශයේ පෞරව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ප්‍රකාශනය ඔබ අතට පත්වේ.

හැඳින්වීම

උතුරු අක්ෂාංශ 5° 55' සහ 9° 50' අතරත්, නැගෙනහිර දේශාංශ 79° 40' සහ 81° 53' අතරත් පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව වර්ග කිලෝමීටර් 65,610 ක් පුරා පැතිරී ඇති දූපතකි. මේ දිවයින ඉන්දියාවේ දකුණු තුඩුවට ආසන්නව සමකයට උතුරින් පිහිටා ඇත. ඉන්දියාවත් සමග ඇති අවම දුර කිලෝමීටර් 19ක් වේ. මේ ගොඩබිම් කලාප දෙක වෙන්ව ඇත්තේ පෝක් සමුද්‍ර සන්ධියෙනි. කෙසේ වුවත් ඉන්දියාවත්, ශ්‍රී ලංකාවත් එකම මහාද්වීපීය තලයක පිහිටා ඇත. දූපතක් ලෙස වෙන්ව පිහිටීමේ හේතුව නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වූ ගස් වැල් හා සතුන්ගේ ප්‍රතිභවය ඉතා ඉහළ අගයක් ගනියි. තෙත් කලාපයක්, අතරමැදි කලාපයක් හා විශළ කලාපයක් ලෙස වෙන්ස් දේශගුණික ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන ප්‍රධාන පාරිසරික කලාපයන් තුනක් ද මීට අමතරව මන්නාරම හා හම්බන්තොට පෙදෙස්වල ඉතා විශළ තත්ත්වයන්ගෙන් යුත් ශුෂ්ක කලාපයක්



ද දැකිය හැකිය. ඊට මධ්‍යයේ පිහිටි කඳුකරය භූගෝලීය හා පාරිසරික වෙනස්කම් මත රක්වාන කඳු, මධ්‍යම කඳු හා දුම්බර හෙවත් නකල්ස් යනුවෙන් උප කඳුකර පන්ති තුනකට වෙන්කොට ඇත. මේ කඳු පන්ති තුනටම පොදු වූ සත්ත්ව හා ශාක විශේෂ මෙන්ම මේ එකිනෙකට පමණක් සීමා වූ හෙවත් ඊටම ආවේණික වූ සත්ත්ව හා ශාක විශේෂ ද වේ. එබැවින් පරිසර විද්‍යාත්මකව මෙම කලාප ගුණ වැදගත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජීව විවිධත්වය අතින් අතිශයින්ම වැදගත් වන්නේ තෙත් කලාපය බව මැනකඳී කරන ලද පර්යේෂණවලින් සනාථ වී ඇත. ගුහත දැක්වූ කඳු පන්ති තුන ප්‍රධාන වශයෙන්ම තෙත් කලාපය තුළ පිහිටා තිබේ. එහි නැගෙනහිර කොටස් වියළි කලාපයට අයත් වේ. වියළි හා අන්තර් කලාපයේ අද දැකිය හැකි වන ආවරණය ඇත්ත වශයෙන්ම ඓතිහාසික සමයේදී ජනාවාසව තිබී පසු කලෙක නැවත ඇතිවූ වනාන්තර වේ. මේ නිසා ඒවා ද්විතියික වනාන්තර ගණයට වැටේ. ඇත්ත වශයෙන්ම රත්නපුර පෙදෙස පිහිටා ඇත්තේ ජීව විවිධත්වය අතින් ගුණාල අගයක් ඇති තෙත් කලාපයේ මධ්‍යයේ යැයි කීම වඩාත්ම නිවැරදිය. වර්තමාන ජීව විවිධත්වය සම්බන්ධව පමණක් නොව වසර දහස් ගණනක් ඇතට දිවෙන සත්ත්ව හා මානව පරිණාම කතාන්දරයේ හෙවත් ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් සාධක ද නොඅඩුව ලැබෙන නිසා මේ පෙදෙසේ අගය වඩාත් ගුහළු නැංවේ.



ශ්‍රී පාද අඩවියේ කඳුකර වැසි වනාන්තර (VW)

රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත පෙදෙසේ ජීව විවිධත්වය

රත්නපුරය පිහිටා ඇත්තේ මධ්‍යම කඳු පන්තියත්, රක්වාන කඳු පන්තියත් අතර වූ නිමින භූමිය තුළය. මේ කලාපය ප්‍රධාන වශයෙන්ම කළු ගං දෝණිය තුළ පිහිටා තිබේ. නැගෙනහිරින් වලව ගං දෝණියටද අයත් වේ. රත්නපුරයේ පහත් පෙදෙස් මුහුදු මට්ටමේ සිට දළ වශයෙන් මීටර 30 ක උසින් පිහිටිය ද එම සීමාවේ පරාසය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 2243 ක් දක්වා උස් ශ්‍රී පාද අඩවිය දක්වා ද පැතිරේ. භූ විෂමතාවය අතින් අධික බැවුම් සහිත පෙදෙසකි රත්නපුරය. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකතම වර්ෂාපතනය වන වාර්ෂිකව මිලිමීටර 6000 ක වර්ෂාවක් මේ කලාපයට ලැබේ. වසර මුළුල්ලේම වර්ෂාව ලැබුණත් මේ කලාපයට ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ෂාව ලැබෙන්නේ මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා අතරතුර කාලයේ ලැබෙන නිරිතදිග මෝසම් වර්ෂාවෙනි.



කඳුකර වනාන්තර (VW)

වසර පුරාම ලැබෙන අධික සූර්යාලෝකයත්, අඩණ්ඩව ලැබෙන වර්ෂාවත් නිසා රත්නපුර හා ඒ ආශ්‍රිත පෙදෙස වසා පැතිර ඇත්තේ හොර ගස් ප්‍රමුඛ ශාක ප්‍රජාවකිනි. රත්නපුරයට දකුණින් පිහිටි සිංහරාජ වන ආවරණය හා ඒ ආශ්‍රිත ශාක හා සත්ත්ව ප්‍රජාව එලෙසම මේ කලාපයේ ද පැතිර ඇත. හොර කුලයට අයත් (*Dipterocarpaceae*), බු හොර (*Dipterocarpus hispidus*), හොර (*D. zeylanicus*), රත් දුරුල්ල (*Hopea jucunda*), බෙරලිය දුන් (*Shorea affinis*),

චීනිය දුන් (*S. congestiflora*) හා නවද (*S. stipularis*) ආදී විශාල ගස් රත්නපුර පළාතේ ස්වාභාවික පරිසරයන්හි දැකිය හැකිය. පහත් බිම් කලාපයන්හි ප්‍රමුඛතම වෘක්ෂ කුලය හොර ය. එසේ වුවද ඇටඹ (*Mangifera zeylanica*), වල් දෙල් (*Artocarpus nobilis*), වලු කීන (*Calophyllum bracteatum*), කැකුණ (*Canarium zeylanicum*) හා කිතුල් (*Caryota urens*) යන වෘක්ෂ ද මෙහි වඩාත් සුලභ වේ. මෙහි වූ අධික ආර්ද්‍රතාවය හෙවත් ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා නිසා සෑම අනුමුල්ලකම පරණාංග ශාක දැකිය හැකිය. මේ පරණාංග තෙතමනය ඇති සෑම තැනකම ද, මහා වෘක්ෂ මත අප්‍රිශාක ලෙස ද වැඩේ. රත්නපුරයට ඊසාන දෙසින් පිහිටා ඇති ශ්‍රී පාද අඩවිය පරිසර විද්‍යාත්මකව ඉතා අගනා බිම් පෙදෙසක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. තවමත් හරි හැටි ගවේෂණය නොකළ මේ කලාපයේ පහත් පෙදෙස් පහතරට තෙත් වනාන්තරවලින් ආවරණය වී තිබේ. විශේෂයෙන් උස් මට්ටම මීටර 1000-1500 ඉක්මවන කලාපය කඳුකර වන ප්‍රජාව නියෝජනය කරයි. දැනට මෙරට ඉතිරිව ඇති තෙත් කලාපීය වනාන්තර අතරින් ජීව විවිධත්වයෙන් අනූන ශ්‍රී පාද අඩවිය නිසා රත්නපුර පෙදෙසට අති විශාල පරිසර විවිධත්වයක් හිමි වේ. ශ්‍රී පාද අඩවියේ උස් කඳුකරය ආවරණය කරනුයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තෙල් කීන (*Calophyllum walkeri*), මිහිරිය (*Gordonia ceylanica*), රතු මිහිරිය (*G. speciosa*), තිත්ත වෙරළ (*Elaeocarpus glandulifer*), බදුල්ල (*Semecarpus nigro-viridis*), අලි කන් (*Actinodaphne speciosa*) ආදී කඳුකර වෘක්ෂයන්ගෙනි. මෙබඳු විවිධත්වයක් දරන මේ කලාපය තුළ උඩවැසියා, ආරෝහක වැල්, තෘණ ආදී ශාකයන්ගේ ඉතා ඉහළ විවිධත්වයක් දක්නට ලැබීම ද විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුය. විශේෂයෙන්ම මේ ඉහළ කඳුකරයේ විවෘත තෘණ පදුරු අතර වැඩෙන මහරත්මල් (*Rhododendron zeylanicum*) ගස් වනාන්තරයට සුන්දරත්වයක් එක් කරයි. එ වසර පුරාම එහි හටගැනෙන රත්පැහැ විශාල මල් නිසාය.




Acavus ගණයේ ගොළුබෙල්ලක් (SN)

රත්නපුරය හා එ ආශ්‍රිත කලාපය අප රටට ආවේණික වූ සතුන්ගෙන් ගණනාව පවතී. වර්ෂා වන ආවරණය තුළ වසන මේ සතුන් බොහොමයක්ම පොදුවේ මුළු තෙත් කලාපය පුරාම දැකිය හැකිය. සෙවන හා තෙතමනය ඇති ගස් කඳුන් මත ජීවත්වන *Acavus* ගණයට අයත් ප්‍රචක් ගොළුබෙල්ලන් අප රටට ආවේණික අපෘෂ්ඨවංශී සත්ව කාණ්ඩයකි. පරිසරයට ඉතා සංවේදී සතුන්

වන උන් විශළී තත්ත්වයන් යටතේ කිසි විටෙක හමුනොවේ. මෙහි වූ සෑම දිය කඩිත්තකම ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික කුණිස්සන්, ලොකු අඩු ඉස්සන් හා මිරිදිය කකුළුවන් පිවත් වේ. මේ සතුන් මෙරට පිව විවිධත්වයේ ඉතා වැදගත් නියෝජනයක් සහිත සත්ව කාණ්ඩයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය.

මිරිදිය මසුන්

පෘෂ්ඨවංශී සත්ත්ව කාණ්ඩ අතර මිරිදිය මසුන්ට හිමිවන්නේ ඉතා වැදගත් ස්ථානයකි. කළු හා දෝණීය තුළ වූ ඉතා කුඩා දොළ පාරවල සිට ගැඹුරු දිය දක්වා වූ අති මහත් ජල පද්ධතිවලට අනුවර්තනය වුණු මිරිදිය මත්ස්‍ය විශේෂ රාශියක් මේ කලාපයේ පිවත් වේ. ලේ තිත්තයා (*Puntius titteya*), බුලත් හපයා (*P. nigrofasciatus*), දෙපුළුලියා (*P. cuningii*), පොත්කලාස් ඇඹිරාවා (*Lepidocephalichthys jonklaasi*) හා ඉරි ඇඹිරාවා (*Schistura notostigma*) තුරු




බුලත් හපයා


වඳුලින් ආවරණය වුණු සෙමෙන් ගලන දොළවල වසන අප රටට ආවේණික වූ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා මිරිදිය මසුන් වේ. හල්මල් දණ්ඩියා (*Rasboroides vaterifloris*) හා මල්පුළුවිටා (*Malpulutta kretseri*) කුඩා දොළවල පිවත් වන ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික ඉතාම කුඩා මිරිදිය මත්ස්‍ය විශේෂ ලෙස දැක්විය හැකිය. ගැඹුරු හා වේගයෙන් ගලන ගංගාවල පිවත්වන ලෙහෙල්ලා (*Tor khudree*), හීත මස්සා (*Puntius pleurotaenia*) ප්‍රමාණයෙන් විශාල මිරිදිය මසුන් වේ. දිය ඇලි පහිත වන, අධික වේගයෙන් ජලය ගලන ස්ථාන වාසස්ථාන කරගත් ගල්පාත්තියා (*Garra ceylonensis*), රතු වල්ග වැලිගොව්වා (*Sicyopterus halei*) හා රතු තොල් වැලිගොව්වා



ඉරි ඇඹිරාවා



හල්මල් දණ්ඩා



රතු තොල් වැලිගොව්වා

(*Sicyopterus jonklaasi*) වේගයෙන් ගලායන ජලයට මනා අනුවර්තන දක්වන මසුන් වේ. තල්කොස්සා (*Belontia signata*) පැහැදිලි හා ගලායන ජලයේ සෙවන ඇති තැන්වල වසන සුලභ මත්ස්‍යයෙකි. සිරුර රතු හා නිල් වර්ණයෙන් යුක්තය. බල ප්‍රදේශ වෙන් කරගෙන ජීවත් වේ.

උභයජීවීන්

වර්ෂා වනාන්තර ආවරණය හා තෙත් පරිසරය උභයජීවී විශේෂ රැසකටම මනා වාසස්ථාන වනු ඇත. උභයජීවීන් ප්‍රිය කරනුයේ වාතයේ ආරද්‍රතාවය ඉහළ, තෙත් හා සුරියාලෝකය අඩුවෙන් ලැබෙන පරිසරයන්ටය. රත්නපුර හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපය උභයජීවීන්හට මනා තෝතැන්නක් වන්නේ මේ තත්ත්වයන් එහි ඇති නිසාය. එබැවින් මේ කලාපය තුළ උන් බොහොමයක් දැකිය හැකිය. බොහෝ ආදිකල්පික පරිණාමික ලක්ෂණ දරන වකරැලි දිය මැඩියා (*Lankanectes corrugatus*) වඩාත්ම හමුවන්නේ වනය තුළ වූ කුඩා චතුරාවලය. මේ මැඩියා වසර මිලියන 65 ක පමණ සිට ස්වාධීනව පරිණාමය වූ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික සත්ත්වයෙකි. තෙත් ගල් මත ජීවිතයට පුරණ වශයෙන් අනුවර්තනය වී ඇති ලංකා ගල්පර දිය මැඩියා (*Nannophrys ceylonensis*) පැහැලි සිරුරක් දරයි. මේ පෙදෙසේ වූ තෙත් ගල් මත මේ මැඩියාගේ වැඩිහිටියන් මෙන්ම ඉස්ගෙඩියන් ද හමුවේ. මේ මැඩි විශේෂය ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වනවා මෙන්ම තෙත් කලාපයේ පහත රටට පමණක් සීමා වී පැතිර ඇත.



වක රැලි දිය මැඩියා (MM)



ඌකා ගල්පර මැඩියා (MM)



කුඩා කහ හිරිඳුණ්ඩා (SL)



කෙලාර්ටිගේ කුරු ගෙම්බා (SL)



කොටගමගේ ගෙම්බා (MM)

පාද රහිත පණුවන් ආකාර උභයජීවීන් දෙදෙනෙක් මේ කලාපයේ ජීවත් වේ. ඒ, කහ හිරිඳුණ්ඩා (*Ichthyophis glutinosus*) හා කුඩා කහ හිරිඳුණ්ඩා (*I. pseudangularis*) විශේෂයන්ය. උන් බුරුල් පස් අතර හා වැසි වනයේ ඇළ දොළ ඉවුරුවල ජීවත් වේ. රාත්‍රියේ හෝ අඛණ්ඩ වැසි දිනයන්හි පමණක් පොළොව මතුපිටට පැමිණේ. උන්ගේ ශරීරය දෙපස කහ පැහැ තීර දෙකක් වේ. කෙලාර්ටිගේ කුරු ගෙම්බා (*Adenomus kelaarti*) මෙහි වූ ඇළ දොළ දෙපස ජීවත් වන අප රටට ආවේණික ගෙම්බෙකි. සිහින් දිගටි සිරුරක් ඇති මේ විශේෂයට ගස් නැගීමේ හැකියාවද ඇත. කොටගමගේ ගෙම්බා (*Bufo kotagamai*) හා නොලර්ටිගේ ගෙම්බා (*Bufo noellerti*) මිනිස් වාසයෙන් අඩු, වැසි වනාන්තරවල ද ඉදහිට වනය මායිමේ වූ ගෙවතු වල ද දක්නට ලැබේ. නගාමිගේ මොට හොඹු මැඩියා (*Ramanella nagaai*) ගස් මත වූ දිය පිරි බෙනවල වසයි. උන්ගේ ඉස්ගෙඩි අවස්ථා ද මේ බෙන තුළම ජීවත්වීම සුවිශේෂී අනුවර්තනයකි. දුඹුරු මොට හොඹු මැඩියා (*R. obscura*) විශාල ගස් මුල් අතර වූ දිය කඩිති තුළ බිත්තර හෙළන මැඩි විශේෂයකි. මේ මැඩියා වනයේ මෙන්ම ගෙවතු වල ද ජීවත් වේ. තඹවන් දිය මැඩියා (*Rana temporalis*) ඇළ දොළ දෙපස වූ ගල් මත ජීවත්වන ප්‍රමාණයෙන් විශාල මැඩියෙකි. මොවුන් දිවා කල පවා හඬ නගනු ඇත. පදුරු මත ජීවත්වන පදුරු මැඩියන්ගේ විවිධත්වය

මේ පෙදෙසේ වසන සත්ත්ව කාණ්ඩ අතර සුවිශේෂත්වයක් දරයි. මෙහි ගෙවතු වල මෙන්ම ලඳ කැලෑවල ද, මහා වනාන්තරවල ද ඒ ඒ පරිසර නිකේතනයන්ට ආවේණික වූ පදුරු මැඩි විශාල සංඛ්‍යාවක් පිවත් වේ. හිරිගුණු පදුරු මැඩියා (*Philautus cavirostris*) හා පාලාහ පදුරු මැඩියා (*P. reticulatus*) වනයේ උස් ගස් මත පිවත්වන පදුරු මැඩියන් වේ. උන්නේ හඬ සවස් කල හා රාත්‍රියේ උස් ගස් මතින් ඇසිය හැකිය. වකුටු කොළ පදුරු මැඩියා (*P. folicola*) වනයේ වූ පදුරු අතර ඇති විශ්ලී ඇතිලී ගිය කොළ තුළ තම නිකේතනය කරගෙන පිවත් වේ. තියුණු හොඹු පදුරු මැඩියා (*P. cuspis*) අදුරු වනය තුළ දීරායන කොළ රොඩු අතර පිවත්වන දිගු හොම්බක් ඇති සත්ත්වයෙකි. අදුරු ලපවත් පදුරු මැඩියා (*P. sordidus*) ගල් මත පිවිතයට අනුවර්තන දක්වන්නෙකි. උගේ දුඹුරු පුල්ලි සහිත සිරුර ගල් මත පිවිතයට මනා ලෙස හැඩගැසී ඇත. සුලභ පහිඳු ගස් මැඩියා (*Polypedates cruciger*) මිනිස් වාසස්ථානවල වසයි. දික්-හොඹු ගස් මැඩියා (*P. longinasus*) සෙවනැති විශාල වනාන්තරවලට ප්‍රිය කරයි. මේ විශේෂ දෙකම තම බිත්තර තැන්පත් කරනුයේ උන් විසින්ම තනන ලද පෙන කැඳැල්ලකය. ඉහත දක්වා ඇත්තේ මේ කලාපයේ හමුවන තෝරාගත් උභයජීවී විශේෂ සංඛ්‍යාවක් පමණකි. උන් සියලු දෙනාම අප රටට ආවේණික වේ.



නොලර්ට්ගේ ගෙම්බා (AN)



වකුටු කොළ පදුරු මැඩියා (MM)



දුඹුරු මොව් හොඹු මැඩියා (SL)



දික් හොඹු ගස් මැඩියා (RP)

උරගුන්

සිව්‍යා උරගුන් හා සර්පයින්ගේ විවිධත්වය රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිතව ඉතා පොහොසත් මට්ටමක පවතී. පහත රට වර්ෂා වනාන්තරවල සිට ශ්‍රී පාද අඩවියේ උස් පෙදෙස් දක්වා දිවෙන කඳුකර වනාන්තර දක්වා වූ අතරතුර කලාපයේ ඇති අතිමහත් වූ නිකේතන වෙන් කරගෙන උන් ජීවත් වේ. වඩාත් සෙවනැති, වනයේ දිුරා යන කොළ රොඩු අතර ප්‍රංචි අං කටුස්සා



ප්‍රංචි අං කටුස්සා (SL)

(*Ceratophora aspera*) වසයි. ශ්‍රී පාද අඩවියේ ඉහළ කලාපයේ කහමුව අං කටුස්සා (*C. stoddartii*) ජීවත් වේ. මේ කටුසු විශේෂ දෙකම ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පරිණාමය තුළ සුවිශේෂත්වයක් දක්වන්නේ උන් මෙහි මුල්ම පදිංචිකරුවන් නිසාය. වනයේ සිරස් ගස් මත ජීවත් වන කරමල් බෝදිලියාගේ (*Lyriocephalus scutatus*) නාසය මත ගෝලාකාර තෙර්මක් ඇත. පෙද



කහමුව අං කටුස්සා (SL)



කඳු බෝදිලියා (SL)



කලා කටුස්සා (SL)

පාසි සහිත කඳුකරයේ වූ ගස් මත ජීවත් වන්නෙකි කුරු බෝදිලියා (*Cophotis ceylanica*). කුරු බෝදිලියාට යමක් ග්‍රහණය කළ හැකි පරිග්‍රහී වල්ගසක් ඇත. පිරිමි කටුස්සාගේ ප්‍රථම තැල්ලක්

ගෙලේ ඇති කලා කටුස්සා (*Otocryptis wiegmanni*) වනාන්තරයේ දීරා යන කොළ රොඩු අතර වසයි. අප රටට ආවේණික වූ මේ කටුස්සා පහතරට තෙත් කලාපීය වනාන්තරවලදී පහසුවෙන් දැකගත හැකිය.



පුල්ලි වක නිය සුහුනා (SL)



දිවා සැරි සුහුනා (SB)

රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත වනාන්තරවල සුහුනු විශේෂ රැසක් හමුවේ. ගල් බිත්ති, ගල් පැළුම්, පොළොවේ වූ ගල් හා දීරා යන ගස් කඳුන් සුහුනන්ට මනා වාසස්ථාන වේ. පුල්ලි වක නිය සුහුනා (*Geckoella triedra*) මනා ලෙස හෙවන ඇති තෙත් සහිත පොළොවේ බුරුල් ගල් හා කඳුන් යට සැගවී ජීවත් වේ. තද කළු පැහැ මේ සුහුනාගේ සිරුරේ කහ පුල්ලි ඇති අතර වල්ගය කෙටි හා මහත් වේ. පටු හිසැති වක නිය සුහුනා (*Cyrtodactylus cracens*) වනයේ ගල් බිත්ති හා රළු කඳුන් මත සැරිසරන ප්‍රමාණයෙන් විශාල සත්ත්වයෙකි. ලා දුඹුරු පැහැ සිරුරේ පළල් තද දුඹුරු පුල්ලි දැකිය හැකි මේ සත්ත්වයාගේ හිස විශාලව පෙනේ. ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩා දිවා සැරි සුහුනන් (*Cnemaspis* spp.) සෙවනැති තැන්හි ගල් බිත්ති හා ගස් කඳුන් අතර වසයි. බොහෝ සුහුනන් නිශාචර වුවත් මේ කුඩා කඩිසර සුහුනන් දිවා කල ක්‍රියාශීලී වේ. හැලි සුහුනා (*Hemidactylus depressus*) වැසී වනාන්තරවල මෙන්ම නිවෙස් තුළ ද වාසය

කරයි. දුඹුරු පැහැ සිරුරේ තද දුඹුරු පුල්ලි දැකිය හැකි අතර වල්ගයේ සුදු හා තද දුඹුරු තීරු පිහිටයි. වනයේ පෙදු පාසී ගහන ගල් බිත්ති හා ගස්වල රළු පොතු අතර ජීවත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වූ මේ සුහුනන් සුපරික්ෂාකාරීව පරික්ෂා කොට බැලුවහොත් වන ආවරණය තුළදී නිරික්ෂණය කළ හැකිය.

සිව්පා උරගුන් අතරින් සිකනලූන් රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිතව සුලභව හමුවන සත්ත්ව කාණ්ඩයකි. සමීරගේ සරප හීරළුවා (*Nessia burtonii*) හා අංගුලි සරප හීරළුවා (*N. monodactylus*) වනයේ දීරායන කොළ රොඩු හා වැටුණු ගස් කඳුන් අතර ජීවත් වේ. උන්ගේ ගාත්‍රා ක්ෂීණ වී ගොස් ඇති අතර බැලූ බැල්මටම සරපයෙකු මෙන් පෙනේ.

වේලරගේ ලක් ඕරළුවා (*Lankascincus taylori*) සහ ගැන්ස්ගේ ලක් ඕරළුවා (*L. gansi*) දිගු වළගයක් ඇති, ගාත්‍රා හා ඇඟිලි පැහැදිලිව පිහිටන, කොළ රොඩු හා දිරායන කඳුන් අතර ගැවසෙන, අඳුරු පැහැයට හුරු සතුන් වේ. නිවර්තන වැසි වනාන්තරවල තවත් බොහෝ සිකනල් විශේෂ පිවත් වේ. *Mabuya* ගණයේ සතුන් ඊට උදාහරණ වේ. කෙසේ වුවත් ඉහතින් දක්වා ඇති ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික සිකනලුන්ද ඇතුළු තවත් විශේෂ පහතරට කලාපවල සිටි ශ්‍රී පාද අඛණ්ඩ හා ඒ ආශ්‍රිත අනෙකුත් වනබද පෙදෙස්වල වාසය කරයි.

රත්නපුරය හා ඒ අවට ප්‍රදේශය අතිමහත් වූ සර්ප සමූහයක් පිවත්වන කලාපයකි. මල් කරවලා (*Balanophis ceylonensis*) ඉතා අලංකාර හෙමික සර්පයෙකි. කුඩා කළ අඳුරු පැහැ සිරුරේ තැඹිලි පැහැ පුළුල් පිහිටයි. උන් කොළ රොඩු අතර කඩිසරව ගමන් කරයි. දීප්තිමත් කළු පැහැ සිරුරේ සුදු පැහැ තීරු හා පුළුල් දූරන නිර්විෂ සර්පයෙකි දූර කරවලා (*Cercaspis carinatus*). විසකුරු කරවලුන්ගේ පෙනුමක් තිබුණත් බිම වසන නිර්විෂ සතෙකි. කබර දත් කැටියා (*Oligodon calamarius*) මතුපිටින් දුඹුරු පැහැ වුවත් යටි පෙදෙස කළු හා සුදු පැහැයෙන් රටා ගැන්වී ඇත. මේ නිර්විෂ සර්පයා රත්නපුර හා ඒ ආශ්‍රිත වනාන්තර තුළ පිවත් වේ.



තිදි මාපිලා (SL)



මල් කරවලා (RS)



දූර කරවලා (RS)



දෙපත් නකා (RS)

පොළොන්නෙලිය (Hypnale hypnale) හා මුකලන්තෙලිය (H. nepa) කොළ රොඩු අතර පිවත්වන විෂ සහිත සර්පයින් වේ. උන්ගේ විශේෂත්වය නම් එකිනෙකාට වෙනස් වූ වර්ණ රටා පෙන්නුම් කිරීමයි. අප රටට ආවේණික මුකලන්තෙලිය මහ වනාන්තරවල හමුවන අතර පොළොන්නෙලිය මනුෂ්‍ය වාසස්ථානවල පිවත් වේ. පළා පොළඟා (Trimeresurus trigonocephalus) පහතරට වැසි වනාන්තර තුළ රුක් මත වසන විෂ සහිත සර්පයෙකි. දිවා කල නිසොල්මන්ව වාසය කරන අතර රාත්‍රියේ ක්‍රියාශීලී වේ. අප රටට ආවේණික මේ සර්පයා සෙවනැති පදුරුවල, විශේෂයෙන් වනයේ වැව් ඇති බට පදුරු මත සුලභව හමුවේ. දාර පිඹුරා (Python molurus) රත්නපුර පෙදෙසේ බහුලව වාර්තාවන සර්පයෙකි. සුනඛයන් ගිලීමට නිවෙස් කරා ඇදේ. වනාන්තර තුළ ඇළ දොළ අසලදී නිර්ඝණය කළ හැකිය.



රාත්‍රී කාලයේදී වනාන්තර, ලඳු කැලෑ හා මනුෂ්‍ය වාසස්ථානවලදී හමු විය හැකි සර්පයින් අතර මාපිලන් විශේෂ තැනක් ගනියි. මඳ විෂ ඇති මාපිලන් සිහින් හා දිගටි සිරුරු දරයි. නිශාචරයින් නිසා උන්ගේ ඇස් විශාලය. පදුරු මාපිලා (Boiga barnesii), නාග මාපිලා හෙවත් ලේ මාපිලා (B. forsteni) හා නිදි මාපිලා (B. ceylonensis) මෙහිලා විශේෂයෙන් සඳහන් කළ හැකිය. මීට අමතරව කොළ රොඩු, බුරුල් පස් හෝ ගල් යට, කඳුන් යට පිවත් වන නිර්විෂ කුඩා සර්ප කාණ්ඩයකි මැකිල්ලන්. සිහින් දිගටි උන්ගේ හිස මහත් නොවේ. පැහැදිලි ගෙලක් නොදරයි. තැඹිලි හෝ දීප්තිමත් රත් පැහැයට හුරු ලේ මැකිල්ලා (Aspidura brachyorrhos), කුඩා මැකිල්ලා (A. guentheri), කෙටි වල්ග මැකිල්ලා (A. drummondhayi) රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත ස්වාභාවික පරිසරයන්හි පිවත් වේ. ශ්‍රී පාද අඩවියේ ඉහළට යත්ම දළව මැකිල්ලා (A. trachyprocta) හමුවේ. මේ සර්පයින් සියල්ලම පාහේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වේ.

පොළොවේ ගුල් හාරා පිවත් වන සර්පයින් වන තුඩැල්ලන් (Rhinophis spp.) මෙම පරිසරයේ හමුවන නිර්විෂ සතුන්ය. මේ සර්පයින්ට අමතරව උග්‍ර විෂැති තිත් පොළඟා (Daboia russelii) හා නාගයා (Naja naja) විශේෂයෙන්ම මෙම කලාපයේ පිහිටි මානව වාසස්ථානවල ඉතා සුලභය.



කරකළුවා (RS)



තිත් තෙලුකා (RS)

මේ සර්පයින්ට අමතරව ගෙවතු හා වනාන්තර ආශ්‍රිතව ඉතා සුලභ සර්ප විශේෂ ගණනාවක් හමුවේ. දෙපත් නයා (*Cylindrophis maculatus*), ඇහැටුල්ලා (*Ahaetulla nasuta*) කරකළුවා (*Coelognathus helena*), වයිරි හාල්දණ්ඩා (*Dendrelaphis caudolineolatus*) තුරු හාල්දණ්ඩා (*D. tristis*), අළු රදනකයා (*Lycodon aulicus*), මල් රදනකයා (*L. osmanhilli*), කබර රදනකයා (*L. striatus*), අරනි දත් කැටියා (*Oligodon arnensis*) පුල්ලි දත් කැටියා (*O. sublineatus*), වයිරි දත් කැටියා (*O. taeniolata*) හා කබර දත් කැටියා (*O. calamarius*) මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ හැකිය. මේ සර්පයින් සියල්ලම පාහේ නිරවිෂ වේ. මේ අතර උග්‍ර විෂ කරවලෙකු වන දුනු කරවලා (*Bungarus ceylonicus*) මේ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ඉදහිට වාර්තා වේ.




කබරගොයා (AN)

මේ කලාපය ආශ්‍රිතව කළු ගඟ හා ඊට ආසන්නයේ ඇති වගුරු ඉතා සුලභය. මීට අමතරව කළු ගඟ පිටාර ගැඹීම නිසා නිතරම පාහේ ඒ ආශ්‍රිතව තාවකාලික ජලාශ හා වගුරු ඇති වේ. මේ ජලජ පරිසරයන් අතර කබරගොයින් (*Varanus salvator*), ගල් ඉබ්බන් (*Melanochelys trijuga*) හා කිරි ඉබ්බන් (*Lissemys punctata*) යන උරගුන්ද පිවත් වේ. මීට අමතරව තලගොයා ද (*Varanus bengalensis*) මේ කලාපය ආශ්‍රිතව දුලභ නැත. මෙසේ බලන කළ රත්නපුරය, ශ්‍රී පාද අඩවිය හා ඒ ආශ්‍රිත පෙදෙස් උරග විවිධත්වය අතින් ඉතාමත්ම පොහොසත් කලාපයක් බවට නිගමනය කළ හැකිය.

පක්ෂීන්

ගංගා, ඇළ, දොළ, වතුරු, ගෙවතු, ලඳු කැලෑ හා විශාල සහිත නිවර්තන වනාන්තරවල සිට වඩාත්ම උස්, මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1500ට ඉහළින් පිහිටි වළාකුල් වනාන්තර දක්වා වෙනස් වන මේ කලාපය ඇත්ත වශයෙන්ම පක්ෂීන්ට ජීවත්වීමට, කැඳලි තැනීමට ආදී සියලුම




වලි කුකුළා (VW)

අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මනා පරීක්ෂණ සකසයි. මේ හේතුව නිසාම රත්නපුරය හා එ ආශ්‍රිත කලාපවල විශාල පක්ෂීන් සංඛ්‍යාවක් ජීවත් වේ. මේ කලාපයේ අප රටට ආවේණික පක්ෂී ප්‍රතිශතය ද වඩා ඉහළ අගයක පවතී. මීට අමතරව කුඹුරුවල කොකුන්, දිය කාවුන්, පිළිහුඩුවන්, කොරවක්කන්, කිතුලුන් ආදී ජලය ආශ්‍රිතව ජීවත්වන පක්ෂීන් වාසය කරයි. සිංහරාජ වනයේ හමුවන පක්ෂීන් සියල්ලම පාහේ මේ කලාපය තුළින් වාර්තා වේ. පිටරටින් පැමිණෙන පක්ෂීන් ද එ ආකාරයෙන්ම මේ පෙදෙසින් වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික පක්ෂීන් අතුරින් විශාලතමයා වන ශ්‍රී ලංකා වලි කුකුළා (*Gallus lafayetii*) ළඳු කැලෑවල සිට විශාල වනාන්තර දක්වා ඉතා විශාල පාරිසරික කලාපයක පැතිර ඇත. ශ්‍රී ලංකා හඩන්-කුකුළා (*Gallus bicalcarata*) වඩාත්ම ප්‍රිය කරනුයේ අඳුරු හා තෙත් වනාන්තරවලටය. මේ විශේෂ දෙකම භෞමික පක්ෂීන් වන අතර උන්ටම වෙන් කරගත් ප්‍රදේශ තුළ ජීවත් වේ.

ශ්‍රී ලංකා අළු ගිරවා (*Psittacula calthropae*) මෙහි වූ සෑම පහත් පෙදෙසකම පාහේ රංචු වශයෙන් ජීවත් වේ. උන් ඉතා ඉහළින් පියාඹන අතර දිරාගිය විශාල ගස්වල වූ බෙන තුළ බිත්තර තැන්පත් කරයි. ශ්‍රී ලංකා ගිරාමලිත්තා (*Loriculus beryllinus*) මහ වනාන්තරවල මෙන්ම ලඳු කැලෑ හා මනුෂ්‍ය වාසස්ථානවල ද එක ලෙස ජීවත් වේ. ආහාරයට සුදුසු ඉඳුණු පළතුරු, ඇඟි තැන්හි උන් දැකිය හැකිය. ඉතා වේගයෙන් පියාඹන ගිරා මලිත්තා බොහෝ විට හුදෙකලාව දැකිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකා වන රතු මල්කොහා (*Phaenicophaeus pyrrhocephalus*) විශාල වනාන්තර තුළ ජීවත්වන නිශ්ශබ්ද පක්ෂියෙකි. බොහෝ දුරට විශාල කෘමීන් මත යැපෙන මේ පක්ෂියා අනෙකුත් පක්ෂීන් සමඟ සාමූහිකව ජීවත් වේ. මුහුණ රත් පැහැ නිසා වන රතු මල් කොහා යන නම ලැබී ඇත. ශ්‍රී ලංකා බට ඇටිකුකුළා (*Centropus chlororhynchus*)

ගෙවතු වල හමුවන ඇටිකුකුළාට බොහෝ දුරට සමාන වුවද හොට ලා කොළ පැහැතිය. දැකගැනීම තරමක් අපහසු වුවත් ඝන වනාන්තරයේ යටි වියනේ හටගන්නා බට පඳුරු අතර ජීවත් වේ. බට ඇටි කුකුළා කටුස්සන්, ගොඵබෙල්ලන් ආදී කුඩා සතුන් දඩයම් කර ආහාරයට ගනියි. ශ්‍රී ලංකා රන්මුණත් කොට්ටෝරුවා (*Megalaima flavifrons*) ගෙවතු , ලඳු කැළෑ හා ද්විතීයික වනාන්තරවල හටගන්නා ගැඹුම (*Trema orientalis*) ගස්වල හටගන්නා එල කෑමට බොහෝ ප්‍රියතාවක් දක්වයි. එමෙන්ම ගෙවතු වල වචන පළතුරු කෑමට ද එවාට පැමිණේ. ශ්‍රී ලංකා කැහිබෙල්ලා (*Urocissa ornata*) යුගල් වශයෙන් හෝ රංචු වශයෙන් මහ වනාන්තරවල හමුවේ. මුහුදු මට්ටමේ සිට පහත් කලාපවල සිට උස් වනාන්තර දක්වා එක ලෙස පැතිරීමක් දරයි. රතු , නිල් හා සුදු පැහැයෙන් වර්ණ ගැන්වී ඇති කැහිබෙල්ලාට උෟෂ ආවේණික වූ



ශ්‍රී ලංකා කැහිබෙල්ලා (VW)



ශ්‍රී ලංකා කහ කන් කොණ්ඩා (VW)

ත්‍රියුණු හඬක් ඇත. වනයේ ඇළ දොළ අසල වූ උස් ගස් කැඳලි තැනීම සඳහා බොහෝ විට තෝරා ගනියි. ශ්‍රී ලංකා වත සුදු ශාරිකාවා (*Sturnus albobfrontatus*) විශාල වනාන්තරවල උස් ගස් මුදුන්වලට වඩාත් ප්‍රිය කරයි. බොහෝ දුරට රංචු වශයෙන් ජීවත් වේ. ශ්‍රී ලංකා සැලළිහිණියා (*Gracula ptilogenys*) ත්‍රියුණු හඬක් ඇති බොහෝ ඉහළින් පියාඹන පක්ෂියෙකි. සැලළිහිණින් යුගල් ලෙස හෝ කුඩා රංචු වශයෙන් ජීවත් වේ. උත් විශළී ගිය උස් ගස්වල ඉහළම මට්ටම්වල බෙන තුළ කැඳලි තනයි. වනයේ වූ ඉදුණු එල කෑමට පහළ මට්ටම්වලට පැමිණේ. ශ්‍රී ලංකා කහ කන් කොණ්ඩා (*Pycnonotus penicillatus*) ශ්‍රී පාද අඩවියේ වූ උස් කලාපවල ජීවත්



ශ්‍රී ලංකා රතු දෙමලිච්චා (VW)


වේ. උන් ප්‍රධාන වශයෙන් එල හා ගෙඹි මත යැපේ. ශ්‍රී ලංකා රතු දෙමලිච්චා (*Turdoides rufescens*) මෙහි වූ සෑම කලාපයකම වාසය කරයි. හොඳින් තුරු සෙවන ඇති ගෙවතු වලත්, විශාල වනාන්තර වලත් එක ලෙස ජීවත් වේ. සාමාන්‍යයෙන් එක් රංචුවක කුරුල්ලන් 5-15 ක් අතර සංඛ්‍යාවක් වේ. සරව භක්ෂක රතු දෙමලිච්චා සෑම විටම පාහේ හඬ නගයි. ශ්‍රී ලංකා අළු දෙමලිච්චා (*Garrulax cinereifrons*) මහා වනාන්තර තුළ ජීවත් වේ. බොහෝ විට රතු දෙමලිච්චා සමඟ හමුවේ. සරව භක්ෂකයෙකි. ශ්‍රී ලංකා බොරග දෙමලිච්චා (*Pellorneum fuscocapillum*) ළදු කැලෑවලට බොහෝ ප්‍රියකරන පක්ෂියෙකි. කුඩා

රංචු වශයෙන් ජීවත් වේ. බොරග දෙමලිච්චාගේ තියුණු හඬ බොහෝවිට උදය හා සවස් කාලවලදී පැහැදිලිව ඇසිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකා මයිල පරෙවියා (*Columba torringtoni*) කඳුකර පිවිත්තයට වඩාත්ම ප්‍රිය කරයි. රත්නපුර හා එ ආශ්‍රිත උස් කලාපවල වූ වනාන්තරවල දුලභ නොවන පක්ෂියෙකි. ශරීරය අඳුරු පැහැ වූවන් ගෙල පිටුපස කළු හා සුදු වර්ණ රටාවන්, රත්පැහැ පාදන් නිසා පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකා දැ-දෙමලිච්චා (*Pomatorhinus horsfieldii*) වන සුදු, කහ හොටැහි, දුඹුරුවන් පිටක් ඇති, ඇසට ඉහළින් සුදු තීරුවක් සහිත ඉතා අලංකාර පක්ෂියෙකි. තුරු සෙවන ඇති ගෙවතු වල මෙන්ම මහ වනාන්තරවල ද එක ලෙස හමුවේ. උන් සවස් කල රංචු වශයෙන් හඬ නගමින් ගසින් ගසට යාම සාමාන්‍ය සිරිත වේ. ශ්‍රී ලංකා අළු කැදැත්තා (*Ocyeros gingalensis*) ඕනෑම පරිසරයක හමුවන පක්ෂියෙකි. නිතරම පාහේ එළවෙකු මෙන් හඬ නගන මේ කැදැත්තා බෙන තුළ කැදලි තනයි. හුදෙකලාව හෝ යුගල වශයෙන් බොහෝ විට ජීවත් වේ. ගම්මානවල ද සුලභ වේ. ඉදුණු ගෙඹි කැමට එසේ පැමිණේ. ශ්‍රී ලංකා නිලන-මැසිමාරා (*Eumyias sordida*) අඳුරු නිල් පැහැතිය. මේ මැසිමාරාවා ගෙවතු වල මෙන්ම මහ වනාන්තරවල ද ජීවත් වේ. විශේෂයෙන්ම ඇළ දොළ දෙපස වූ සෙවනැති තැන්හි තුරු මත හිඳ කෘමීන් දඩයම් කරයි. එතරම් සිත්ගන්නා වර්ණ රටාවක් නොදරයි. ශ්‍රී ලංකා වනරැවියා (*Bradypterus palliseri*) කඳුකරයේ ජීවත්වන අඳුරු පැහැ, ප්‍රමාණයෙන් කුඩා පක්ෂියෙකි. මානා පඳුරු, බට පඳුරු හෝ ඕනෑම පඳුරක සැඟවී ජීවත් වේ.


කමීරපායින්

කමීරපායින් ගැන සලකා බලන කල කුඩා හික්මයන්ගේ සිට අලියා දක්වා වු අති විශාල විශේෂ සංඛ්‍යාවක් මේ පෙදෙසින් වාර්තා වේ. විශ්ලී කලාපීයව වසන තිත්මුවන් හා වලසුන් මෙහි හමුනොවුණද පොදුවේ අනෙකුත් සියලුම කමීරපායින් මෙහි වාර්තා වේ. කුඩා හික්ම විශේෂයන් කිහිපයක්ම (*Solisorex pearsoni*, *Suncus etruscus*, *S. fellowes-gordonii* හා *S. zeylanicus*) මේ කලාපයේ හමුවේ. උන් අප රටට ආවේණික වේ. වනාන්තරයේ දීරා යන කොළ රොඩු අතර කුඩා සතුන් ඇතිද කමින් ජීවත් වේ. මේ කලාපයේ වු ගල් ගුහා, ගල් ආවරණ, විශාල ගස් බෙන තුළ කිරි වවුලන් හා එල භක්ෂක වවුලන් බොහෝ සේ ජීවත් වේ. උන් ගෙවතු ආශ්‍රිතව ද වාසය කරයි. විශේෂයෙන්ම එල භක්ෂක වවුලන් ශාඛාශ්‍රිතව වැවෙන පළතුරු කෑමට පැමිණේ.

අප රටට ආවේණික රිළුවා (*Macaca sinica*) හා කොළ වදුරා (*Trachypithecus vetulus*) මහ වනාන්තරවල මෙන්ම මානව වාසස්ථානවල ද එක ලෙස පැතිරී ඇත. උන් ශාඛාශ්‍රිතව වචන එල හා එළවළු බුදීමට නිතරම පාහේ ගෙවතු වලට පැමිණේ. මේ විශේෂ දෙක පහතරට



රිළුවා (VW)



කොළ වදුරා (VW)



උණගසුළුවා (VW)



ශ්‍රී ලංකා මුකලන් ලේනා (VW)


වන මායිම්වලදී පහසුවෙන් දැක බලාගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකා උරාවන්-තිරාසිකයා (*Myophonus blighi*) කඳුකරයේ පමණක් හමුවේ. ශ්‍රී පාද අඩවියේ ඇළ දොළ දෙපස වූ බට පඳුරුවල ඵලිමහන් තැන්හි සැරිසරයි. සමහර අවස්ථාවලදී 3-4 බැහින් වන රංචු වශයෙන් දැකිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකා තිත්පිය තිරාසිකයා (*Zoothera spiloptera*) පහතරට හා කඳුකරයේ මධ්‍යම කලාපයේ මහ වනාන්තරවල සෙවනැති අඳුරු තැන්හි හිඳ තම සුම්යුරු හඬ නිකුත්කරන දුඹුරු හා සුදු තිත්වලින් අලංකාර වූ සිරුරැති පක්ෂියෙකි. බොහෝ විට ඇළ දොළ අසල දිරායන කොළ රොඩු අතර හමුවන කුලැටි පක්ෂියෙකි. ශ්‍රී ලංකා කායුරු තිරාසිකයා (*Zoothera imbricata*) දුඹුරු පැහැ උඩු කයක් හා පිභාටු අඟ කළුවන් අඩසඳු හැඩැති, මහ වනයේ අඳුරු පොළොවේ වසන පක්ෂියෙකි. ගැඹුරු හා කෙටි නාදයක් ඇති මේ පක්ෂියා පහත් වැසි වනාන්තර හා කඳුකරයේ වූ වනාන්තරවල පිවත් වේ. ශ්‍රී ලංකා පිළිලිවිවා (*Dicaeum vincens*) කුඩා කඩිසර පක්ෂියෙකි. උඩු පැත්ත තද නිල් පැහැයට හුරුය. බොහෝ විට යුගල වශයෙන් ගැවසේ. ගෙවතු වල වූ ගැඹුඹ ආදී කුඩා ඇට හා ගෙඩි හටගන්නා ගස් කරා පැමිණෙන අතර බෝවිටිකා කැමටද ප්‍රියකරයි. නමුත් කැඳලි තනන්ගේ ඉතා උස් ගස්වල මුදුනේය. රත්නපුර හා ඒ අවට දලහ නැත. ශ්‍රී ලංකා සීතාසීයා (*Zosterops ceylonensis*) ගේ හිස හා පිට කහවත් කොළ පැහැතිය. යටි කය සුදු පැහැ වන අතර ඇස වටා සුදු පැහැ වළල්ලක් දරයි. පෝඩු වශයෙන් හෝ කුඩා රංචු වශයෙන් ගසින් ගසට සැරිසරන්නේ ඉදුණු පළතුරු ආහාරයට ගැනීමටය. කඳුකරයට ප්‍රියකරන අතර ගෙවතු වල ද දැකිය හැකිය.

මේ සඳහන් කර ඇති ආවේණික පක්ෂීන්ට අමතරව තවත් ආවේණික විශේෂ මේ කලාපය තුළ හමුවන බව කිව යුතුය. එමෙන්ම ආවේණික නොවන පක්ෂීන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ද මෙහිදී දැකගත හැකි වේ. ඊට පරයටන පක්ෂීන්ද අයත් වේ. මෙහිදී බස්සන්, උකුස්සන්, රාජාලියන් ඇතුළු පහතරට වැසි වනාන්තරවලටත් උස් කඳුකර වනාන්තරවලටත් සීමා වූ පක්ෂීන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් සිහිපත් කළ හැකිය. සමස්තයක් ලෙස ගත් කල රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපය පක්ෂී විවිධත්වය අතින් වඩා පොහොසත් භූමි ප්‍රදේශයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය.



ශ්‍රී ලංකා අළු කැදැත්තා (VW)

වැසි වනාන්තරවල සිට වඩාත්ම උස් වළාකුල් වනාන්තර දක්වා පැතිර ඇත. හිමලා (*Canis aureus*), දිවියා හෙවත් කොටිකා (*Panthera pardus*), කොළ දිවියා (*Prionailurus rubiginosus*) හා හඳුන් දිවියා (*P. viverrinus*) මෙහි වූ සැම පරිසර පද්ධතියකම පාහේ දැකිය හැකිය. උන් සියල්ලම පාහේ උග්‍ර මාංශ භක්ෂකයින් වේ. ශාඛාශ්‍රිතව මෙන්ම වනාන්තරවලද එක ලෙස ජීවත්වන හෝතඤ්චන් (*Herpestes brachyurus*, *H. edwardsi*, *H. smithii* හා *H. vitticollis*) විශේෂ හතරම මේ කලාපයේ දුලභ නැත. උන් සර්පයින් ඇතුළු කුඩා සතුන් මත යැපේ. දිය බල්ලා (*Lutra lutra*) මෙහි වූ සැම ජල පද්ධතියකම පාහේ ජීවත් වේ. නිවෙස් අසල නිතරම වාගේ හමුවන උගුඩුවා (*Paradoxurus hermaphroditus*) එල හා මාංශ භක්ෂකයෙකි. උන් වනාන්තරවලට සීමා නොවී නිවෙස් අසල ද ජීවත්වන්නේ එවායේ වසන සතුන් හා එල බුද්මටය. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික රන් කළුවැද්දා (*P. zeylonensis*) රන්වන් පැහැ, රුක්වැසි, එල හා මාංශ භක්ෂකයෙකි. රන් කළුවැද්දා වනශට වඩාත් ප්‍රියකරයි. උරුලුවා (*Viverricula indica*) සුදු හා කළු වර්ණ රටාවක් ඇති සතෙකි. වනශේත්, නිවෙස් අසලත් එක ලෙස හමුවන අතර කුඩා සතුන් දඩයම් කරයි. ශ්‍රී පාද අඩවියේ 3-4 ක පමණ වූ අලි (*Elephas maximus*) රංවුවක් වාසය කරයි. උන් ඉතා සීග්‍රයෙන් වදවෙමින් පවතී. තෙත් ඝන වනාන්තරවලට වඩා අලිත් ප්‍රිය කරනුයේ වියළි තැනිතලා බිම්වලටය. කෙසේ වුවත් ශ්‍රී පාද අඩවියේ වාසය කරනුයේ තෙත් කලාපයේ ඉතිරිව ඇති අවසාන අලි කීපදෙනාගෙන් කොටසක් බව කිව යුතුය.



ගෝනා (*Cervus unicolor*), වැලි මුවා (*Muntiacus muntjak*), වල් උරා (*Sus scrofa*) හා මී මින්නන් (*Moschiola meminna* හා *M. kathygre*) මෙහි වූ ගෙවතු, ලඳු කැලෑ, පහතරට වැසි වනාන්තර හා උස් කඳුකර වනාන්තර දක්වා එක ලෙස පැතිර වසයි. මේ අතරින් මී මින්නන් අප රටට ආවේණිකය. උන් නිවෙස් ආශ්‍රිතවද ඉතා සුලභව හමුවේ. මීට අමතරව ඉත්තෑවා (*Hystrix indica*), කබල්ලුවා (*Manis crassicaudata*) හා වල් හාවා (*Lepus nigricollis*) නිවෙස් අසල වූ ලඳු කැලෑවල සුලභය. උන් මහ වනයේද එක ලෙස හමුවේ. මෙයින් ඉත්තෑවා හා කබල්ලුවා උස් කඳුකර වනාන්තරවල ඉතා දුලභය. ගස් මත වසන දඬුලේනා (*Ratufa macroura*) මෙහි වූ සැම තැනකම පාහේ දැකිය හැකිය. කඳුකරයේ දඬුලේනා හා පහත් කලාපයේ දඬුලේනා අතර ශාරීරික වෙනස්කම් දැකිය හැකිය. අප රටට ආවේණික ශ්‍රී ලංකා දෙපයේ කටු හීන්-මීයා (*Mus mayori*), ශ්‍රී ලංකා තෙළු මීයා

(*Rattus montanus*), ශ්‍රී ලංකා දෙපැහේ මීයා (*Srilankamys ohienensis*), ශ්‍රී ලංකා ගස් මීයා (*Vandeleuria nolthenii*) මෙහි වූ නිවර්තන වැසි වනාන්තරවල හමුවන කෘන්තකයින් වේ. මොවුන්ට අමතරව තවත් මී විශේෂ ගණනාවක්ම මෙහි වාර්තා වේ. සමහර විශේෂ මනුෂ්‍ය වාසස්ථානවලට පමණක් සීමා වී ඇත. මේ මීයන්ට අමතරව වනාන්තරයේ අදුරු සෙවනැති ගස් කඳුන් අතරේ ජීවත්වන ලේනුන්ද වේ. ශ්‍රී ලංකා මුකලන් ලේනා (*Funambulus layardi*) ප්‍රංචි ලේනා (*F. sublineatus*) හා ගෘහාශ්‍රිතව සැරිසරන ලේනා ද (*F. palmarum*) මෙහිදී සඳහන් කළ හැකිය. ලේනුන් කුඩා සතුන් මෙන්ම එල හා ඇට වර්ග ආහාරයට ගනියි. රත්නපුරය හා එ ආශ්‍රිත කලාපයේ වර්තමානයේ වල් මිමුන් (*Bubalus bubalis*) ජීවත් වන බවට වාර්තා වී නැත. ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර පළාත් රැසක කැලෑවල වල් මිමුන් ජීවත් වුවත් මේ පෙදෙසේ එසේ වාර්තා නොවේ. කෙසේ වුවත් ලැබෙන පොසිල සාධක අනුව ඇත අතීතයේ මෙහි කුළු මිමුන් ජීවත්ව ඇත. රත්නපුරය හා එ ආශ්‍රිත කලාපය ආවේණික මෙන්ම ආවේණික නොවන කිරීරපායින් බහුලව ජීවත්වන කලාපයක් බව මේ අනුව පැහැදිලි වේ. එකිනෙකට වෙනස් පාරිසරික හා භූගෝලීය තත්ත්වයන් මත අනුවර්තනය වීම් යටතේ මේ විවිධත්වය වැඩි වී ඇති බව සිතිය හැකිය.



වල් පෘරා (VW)




වල් මුවා (SN)



ගෝනා (SN)

ප්‍රාග් ඓතිහාසික වැදගත්කම

රත්නපුරය පෙදෙස ලොව සුපතල වන ලෙස ප්‍රාග් ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුක්තය. එ ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් හේතුකොටගෙනය. මින් පළමුවැන්න මානව විද්‍යාත්‍යඥ තුනන මානවයා හෙවත් *Homo sapiens* ගේ ආදිතම ජනාවාස, එම මානවයන් භාවිත කළ ශිලා හා සත්ත්ව අස්ථිවලින් නිර්මිත මෙවලම් එමෙන්ම ඔවුන් අනුභවකොට ඉතිරි වූ සත්ත්ව හා ශාක ශේෂ මේ පෙදෙසේ ගල්ගුහා තුළින් හමුවීමය. දෙවැන්න මීට වසර ලක්ෂ කීපයකට එපිට පිවිත් වූ විශාල ක්ෂීරපායී සතුන්ගේ පාමාණිකුත වූ ශරීර කොටස් හෙවත් පොසිල මේ භූමියෙන් හමුවීමය.



වනාන්තරයකුගේ පහළ වාර්ථක දත්

රත්නපුරය, කුරුවිට, අවිස්සාවේල්ල, කලවාන ඇතුළු එ ආශ්‍රිත තවත් බොහෝ පෙදෙස්වලින් මීට වසර දහස් ගණනකට එපිට පිවිත් වූ විශාල ක්ෂීරපායීන් ඇතුළු තවත් සත්ත්ව සමූහයකගේ පොසිල හමුවේ. පසුගිය සියවසේ මැද භාගයේ සිටම මේ පිළිබඳව පර්යේෂණ පැවැත්වීමට මුලපුරන ලද්දේ එවකට කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ධුරය හෙබවූ අප රට බිහිවූ ශ්‍රේෂ්ඨතම ස්වභාව විද්‍යාඥයා වූ නැසිගිය පී. ඊ. පී. දැරණියගල මහතා විසින්ය. රත්නපුරය ආශ්‍රිත මැණික්

පතල් හා ඇළ දොළවලින් මේ පොසිල හමුවේ. මැණික් පතල්වල වූ ඉල්ලම්වලින් මේ පොසිල විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විට හමු වී තිබේ. ඉන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේද තවත් කොටසක් රත්නපුර කෞතුකාගාරයේද ඉතිරිය එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවර පිහිටි ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේද තැන්පත් කොට ඇත. මැණික් ඉල්ලමේ දියළු පස් අතර හමුවන මේ පොසිල ප්‍රධාන වශයෙන්ම දත් හා අස්ථි කැබලි වේ.


අධික බැවුම් හා වසර මුළුල්ලේම ඇදහැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් රත්නපුර හා එ ආශ්‍රිත කලාපයේ නිතරම පාහේ සෝදාපාළුව මගින් ගසාගෙන යන පාංශු කොටස් පහත් දෙණිවල තැන්පත් වේ. එම නිසා මේ පොසිල නිතරම හමුවන්නේ ඉල්ලම් පස්වල හා ගංගා පතුල්වලය. මේ හේතුව නිසා කිසිම අයුරකින් මිශ්‍රය සතුන්ගේ පුරාණ සැකිලි පොසිල වශයෙන් හමු නොවේ. එයට හේතුව එකල සතා මිශ්‍රය ස්ථානයේ සිට මේ සැකිලි හා දත් යම් දුරක්

බැවුම් දිගේ වැසි පලය සමග රූවා ගොස් තිබීමය. පුරාවිද්‍යාත්මකව සලකා බැලූ කල මේ පොසිල හමුවන මැණික් පතල් හෝ ගං පතුල්වල පස් ක්‍රමානුකූල ස්ථරායනයක් අනුව තැන්පත් වී නැත. එවා ද්විතීයික තැන්පතු වේ. මේ නිසාම මේ පොසිල නිසියාකාරව කාල තීරණය කිරීමේ හැකියාවක් නැත. කෙසේ වුවත් රත්නපුරය ආශ්‍රිතව හමුවන පොසිල ඉන්දියාවේ නර්මදා හා ශිවාලික් තැන්පතු අතරේ හමුවන පොසිලවලට හැම අතින්ම සමානය. එකල රත්නපුරයේත්, ශිවාලික් හා නර්මදා ප්‍රදේශවලත් ජීවත්ව ඇත්තේ එකම පරපුරකට අයත් සත්ත්ව සත්ත්වයකි. සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනවලට අනුව රත්නපුර පොසිල අයත් වන්නේ භූ ඉතිහාසයේ අවසානතම අවධීන් වූ ජලයිස්ටොසීන (Pleistocene) හා හොලොසීන (Holocene) අවධීන්වලටය. ජලයිස්ටොසීන අවධිය අදින් වසර ලක්ෂ 18කට (මිලියන 1.8කට) පෙර ආරම්භ වී අදින් වසර 10,000-12,000කට එපිටදී නිමා විය. අද අප සිටින්නේ හොලොසීන අවධියේය. *Homo sapiens* ලොවට බිහි වූයේ ජලයිස්ටොසීන අවධියේය. මේ අනුව බලන කල නූතන සත්ත්වයන්ගේ හා ශාකවල පැතිරීම, නූතන මානවයා අප්‍රිකාවේ බිහිවීම හා ඔහු ලොව පුරා පැතිරීම ඇතුළු සත්ත්ව හා පරිසර විද්‍යාත්මකව ඉතා සුවිශේෂ වූ ක්‍රියාවලි රැසක්ම මේ අවධිය තුළ සිදු විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජලයිස්ටොසීන අවධියට අයත් පොසිල ප්‍රධාන වශයෙන්ම හමුවන්නේ රත්නපුරය ආශ්‍රිතවය. පසුගිය දශක 06කට වැඩි කාලයක සිටම මේ පර්යේෂණ සඳහා විශාල දායකත්වයක් මෙහි වූ මැණික් කර්මාන්තයේ යෙදුණු අයගෙන් ලැබිණි. ඒ, ඔවුන් තම මැණික් ඉල්ලමෙන් හමුවන



මේ පොසිල කොටස් පාඨක කෞතුකාගාරය වෙත ලබාදීමෙන් මෙම මාසැති කර්තව්‍යයට දායක වී ඇති නිසාය. ඔවුන් ඉතා පරිස්සමින් මේ කාර්යය ඉටු නොකරන්නට අපට තවමත් වසර දස දහස් ගණනකට එපිට පිවිත් වූ මේ පොසිලගත වූ සතුන් පිළිබඳ අදහසක් නොලැබෙන්නට ඉඩ තිබුණි.




එකල ඕපොසොටේමස් පීචමානව සිටි ආකාරය



කහවේනුන්ගේ වාර්ථක දත් (වම්පස *Rhinoceros sinhaleyus* සහ දකුණේ *R. kagavena*)

මේ පොසිලගත වූ සතුන් අතර අදින් වසර ලක්ෂයකට හෝ ඊට ප්‍රථම ජීවත් වූ විශාල ක්ෂීරපායීන් තිදෙනෙකු දැක්විය හැකිය. එනම් දැවැන්ත හස්තීන් විශේෂ දෙකක් මේ පළාතේ ජීවත්ව ඇත. පොසිල බවට පත්වූ උන්ගේ දත් හමු වී තිබේ. උන් විද්‍යාත්මකව *Elephas namadicus* හා *E. lhyudricus* නම් වේ. මීට අමතරව මේ කාලයටම අයත් හිපොපොටේමස් විශේෂයකට (*Hexaprotodon sinhaleyus*) අයත් පොසිල බවට පත් වූ දත්, ගාත්‍රා හා හකු කොටස් බොහොමයක් රත්නපුර හා ඒ ආශ්‍රිත මැහික් පතල්වලින් හමුවී ඇත. මීට සමගාමීව ඉන්දියාවේ හා තවත් නැගෙනහිර ආසියානු රටවල් ගණනාවකම මේ අවධිය තුළ හිපොපොටේමස් වාසය කොට ඇති අතර අද උන් සියල්ලම පාගේ වඳවී ගොස් ඇත. ඉදිරි දත් හෙවත් කෘන්තක දත් කේ දැරීම නිසා මේ විද්‍යාත්මක නම ලැබී ඇත. (*Hexa* = හය, *proto* = ඉදිරි, *don* = දත්) කෙසේ වුවත් අවිස්සාවේල්ල සිට රත්නපුරය අතර වූ සමතල බිම් පෙදෙස එකල විශාල වගුරු පෙදෙසක් ලෙස තිබී ඇති බව හඳුනාගෙන තිබේ. එහි මේ හිපොපොටේමස් විශේෂය යහතින් ජීවත් වන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.



Rhinoceros kagavena නම් කඟවේනා ජීවමානව සිටි ආකාරය

කඟවේනුන් හෙවත් රයිනොසිරස් විශේෂ දෙකකට අයත් පොසිල ද මැහික් පතල්වලින් හමුවේ. දැනටත් ආසියාවේ කඟවේනුන් විශේෂ 03ක් ජීවත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්ව ඇති විශේෂ අතරින් ප්‍රමාණයෙන් විශාල සත්ත්වයා *Rhinoceros kagavena* ලෙසද, අනෙක් විශේෂය *R. sinhaleyus* ලෙසද විද්‍යාත්මකව නම් කොට තිබේ. පොසිල වූ දත්, අස්ථි කොටස් හා හකු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මැහික් පතල් තුළින් හමුවී ඇත. දැනට කර ඇති කාලනිර්ණයන්ට



Rhinoceros sinhalensis නම් කශේනා පිවමානව සිටි ආකාරය

අනුව උන් අදින් වසර 80,000 කට එපිට මේ කලාපයේ පිවත්ව ඇත. මේ විශේෂ දෙකම තනි අගක් දරන රළු සමක් ඇති සතුන්ය. උන් වැසි වනාන්තරවල මෙන්ම සැවනා හා තෘණ බිම්වල පිවත්වන්නට ඇත.

ගවරා (*Bos gaurus*) අප රට පිවත්ව වඳවී ගිය ගව කුලයේ විශාලතම සාමාජිකයා වේ. ගවරා යනු කළු පැහැ සමකින් යුත්, ගාත්‍රාහි පහත කොටස් සුදු පැහැ, කෙටි හා වක් වූ අං යුගලක් දරන විශාල ක්ෂීරපායී සතුකි. මීට වසර සියයකට පමණ එපිටදී ශ්‍රී පාද අඩවියේදී ගවරෙකු ඇසින් දුටු බවට සාක්ෂි වාර්තා වී ඇත. උඩරට රාජධානි සමය ගැන රොබට් නොක්ස් විසින් ලියන ලද *An Historical Relation of The Island of Ceylon* නම් ග්‍රන්ථයේ අප රටේ ගවරුන් සිටි බව දක්වා ඇත. කෙසේ වුවත් ගවරා මේ පොසිල සතුන් අතරින් අවසානයටම වඳ වූ සත්ත්වයා ලෙස නම් කළ හැකිය. ගවරුන් අදටත් කේරලයේ කඳු මත වූ තෘණ බිම් අතර වාසය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ගවරුන් පිවත්වූ බවට දත්, ගාත්‍රා කොටස් හා හිස්කබල කොටස් මැණික් පතලවලින් හමුවී ඇත. ශ්‍රී පාද අඩවිය මේ ගවරුන්ට මනා තෝරාගන්නක් වන්නට ඇතැයි සිතිය හැකිය. අප රට ගවර මාන, ගවර මණ්ඩිය, ගවර හිර, ගවර විල ආදී ග්‍රාම නාම මේ සත්ත්වයා ආශ්‍රිතව බිහිවන්නට ඇතුළුව සැක නැත.



ගවරා

රත්නපුර පෙදෙසින් නොවුණත් ගවයෙකුට (*Gona sinhaleya*) අයත්, පොසිල බවට පත් වූ අඟ ආශ්‍රිත හිස් කබලේ කොටසක් මැදිරිගිරිය පෙදෙසින් හමුවීම තුළින් හැඟී යන්නේ ජලයීයරෝසීන සමයේ අප රට ගවයින් පීවත් වූ බවය. මේ ගවයා ප්‍රමාණයෙන් බොහෝ කුඩා විශේෂයක් වන්නට ඇතැයි ලැබී ඇති පොසිලය අනුව උපකල්පනය කළ හැකිය.

බළල පවුලට අයත් විශාල සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකුගේ පොසිල මේ පෙදෙසින් හමුවේ. 1936 දී කුරුවිට අසල ඵදුණ්ඩේවෙලින් හමුවූ සිංහයෙකුට (*Panthera leo*) අයත් හක්කේ වූ දත දැනට අප සතුව ඇති ඉතාම අගනා සිංහ පොසිලය වේ. මෙය මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ස්වභාව විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කොට තිබේ. 1947 දී කුරුවිට ගෝනපිටියේ මැණික් පතලකින් සිංහයෙකුට අයත් රදනක දතක කොටසක්ද හමුවී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහයින් පීවත් වූ කාලපරිච්ඡේදය අපට තවම හරියාකාරව තීරණය කිරීම අපහසු වී ඇත.

සිංහයින් ඉතා සුළු වශයෙන් වර්ෂා වනාන්තරවලට ප්‍රිය කරයි. උන් වඩාත් කැමති තෘණ බිම් අධික, තැන තැන ගස් වැවුණු සැවනා බිම්වලටය. වර්තමානයේ ආසියාවේ සිංහයින් හමුවන්නේ ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ ගිර නම් වනයේ පමණි. උන් අනෙක් සියලුම පෙදෙස්වලින් වදවී ගොස් හමාරය. කෙසේ වුවත් අදට වඩා විශ්ලී දේශගුණයක් රත්නපුර හා ඵ ආශ්‍රිත

පෙදෙස්වල පැවැති කලෙක මේ සිංහයා මෙහි ජීවත් වන්නට ඇත. 1962 දී රත්නපුරයේ මුවගම පිහිටි මැණික් පතලකින් හමුවූ හක්කේ දූත හා වලාදුරේ පිහිටි බටදොඹ ලෙනේ 05 වැනි පස් ස්ථරයෙන් හමුවූ මැද ඇඟිලි පුරුක ඉතා වැදගත් වන්නේ ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තයින්



කුරුවිට බටදොඹ ලෙනෙන් හමුවූ අදිත් වසර 17,000ක් පමණ පැරණි වනාන්ත ඇඟිලි පුරුක

ජීවත් වූ බවට ඇති සාක්ෂි වන නිසාය. අප වනාන්තයා ඉංග්‍රීසියෙන් Tiger යනුවෙන් හඳුන්වන අතර විද්‍යාත්මකව *Panthera tigris* නම් වේ. අංශාර 14 කාලනිර්ණයට අනුව, බටදොඹ ලෙනෙන් හමුවූ වනාන්ත ඇඟිලි පුරුක අදිත් වසර 17,000 ක් පමණ පැරණියි. ඒ, ශ්‍රී පාද අඩවියේ ජීවත් වූ වනාන්තයෙකු වූ අතර බටදොඹ ලෙනේ ජීවත් වූ මානවයා විසින් දඩයම්

කොට මස් පිණිස ලෙහ වෙතට ගෙන එන්නට ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම අප රටේ ජලයීයෝධීන අවධියේ ජීවත්ව වදළී හිස සතුන් අතරින් නිසියාකාර කාලනිර්ණයක් ලැබී ඇත්තේ බටදොඹ ලෙනෙන් හමුවූ වනාන්ත ඇඟිලි පුරුකට පමණි. අදිත් වසර 17,000 කට එපිට ශ්‍රී පාද අඩවිය, හෝර්ටන් තැන්න, සිංහරාජ අඩවිය ආදී පෙදෙස්වල වනාන්තයින් ජීවත් වන්නට ඇති අතර උන් ගවරුන් දඩයම් කරන්නට ඇතිවාට සැක නැත. සිංහයින් රංචු වශයෙන් ජීවත් වුවත් වනාන්තයින් හුදෙකලාව ජීවත් වන සතුන් වේ. ඉන්දියාවේ කේරලයේ අදටත් වනාන්තයින් වාසය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවී ඇති ඇඟිලි පුරුකට අනුව අප රට වනාන්තයා ඉතා විශාල සතෙකු බව හඳුනාගෙන ඇත.

මීට අමතරව දඩයම් බල්ලෙකුගේ පොසිලගත වූ රදනක දූතක් කුරුවිට ගෝනපිටිය මැණික් පතලකින් හමුවී ඇත. විද්‍යාත්මකව *Cuon javanicus* යනුවෙන් හඳුන්වන මේ දඩයම් බල්ලා හිවලාටත්, සාමාන්‍ය බල්ලාටත් සමානකම් දරයි. දැනට ඉන්දියාවේ දඩයම් බල්ලන් ජීවත් වන අතර අප රට හමුවූ විශේෂය වදළී හිස සත්ත්වයෙකු ලෙස හඳුන්වා ඇත.

ඉහතින් විස්තර කළ අදිත් වසර ලක්ෂයකට පමණ එපිට ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වූ විශාල හස්තීන් දෙදෙනාට අයත් පොසිල බොහොමයක් චාර්වක හා පුරස්චාර්වක දූත කොටස්ය. මේ හස්තීන් වදළී හිස හිපොපොටේමස් සමග සමකාලීනව ජීවත් වන්නට ඇතැයි අනුමාන කෙරේ. එම විශේෂ දෙක නම් *Elephas namadicus* සහ *E. hysudricus* ය. මේ විශේෂ වර්තමානයේ ජීවත්වන *E. maximus* ගෙන් වෙන්වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම හිස් කබලේ හා දත්වල හැඩයෙනි.

මානවයින් නූතන මානව වර්ගීකරණයට අනුව වලංගු නොවන බවත්, ඒ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් අධ්‍යයනය කළ යුතු බවත් කිව යුතුය.

මැණික් පතල්වලින් හමුවන ඉහත කී සත්ත්ව හා මානව පොසිලවලට අමතරව ආදි මානවයින් භාවිත කළ ශිලා මෙවලම්ද හමුවේ. කහඳ, තිරුවානා ආදී පාෂාණයන්ගෙන් නිර්මිත මේ රළු ශිලා මෙවලම් නිවැරදි ලෙස කාලනිර්ණය කළ නොහැකි වුවත් මේවා අප රට ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් වැදගත් සාධක වේ. බලංගොඩ වලවේ හං ඉවුරේ බෙල්ලන් බැඳි පැලැස්සෙන් මුලින්ම සොයාගන්නා ලද බලංගොඩ මානවයා හෙවත් අප රට විසූ ආදිතම මිනිසුන් පරිහරණය කළ මේ මෙවලම් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැක්කේ පළපුරුදු අයෙකුට පමණි. මේ ශිලා මෙවලම්වලට අමතරව ආදි මානවයින් ගින්නේද ඇවිලීම සඳහා යොදාගත්තා යයි සිතන විදින ලද රවුම් ගල් හා සිදුරු බොහෝ විදින ලද පැතලි ගල් හෙවත් කිනීහිර රත්තපුරය හා ඒ ආශ්‍රිතව පොළොව මතුපිටද හමුවේ.



පොසිල වූ මානව ශේෂ (වම් පස *Homo sinhalensis* ව අයත් ඇස් කුහරය අසල හිස් කබලේ කොටස සහ දකුණු පස *Homopithecus sinhalensis* ගේ උඩු හනුවේ කන්තක දත)

කුරුවිට බටදොඹ ලෙන

මුහුදු මට්ටමේ සිට දළ වශයෙන් මීටර 500ක් පමණ ඉහළින් කුරුවිට වලාදුරේ නම් ග්‍රාමයේ පිහිටි බටදොඹ ලෙන ලොව ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ නූතන මානවයාට අයත් පැරණිතම සාධක හමුවන ස්ථානය ලෙසිනි. දැනට දශක 06 කට නොවැඩි කාලයක සිට පී.ර.පී. දැරණියගල, ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල හා ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා යන පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් මේ ගුහාව ආශ්‍රිතව කීප වතාවක්ම කැණීම් කර ඇත. මීට වසර 37,000 කට පමණ පෙර සිටම මේ ගුහාව මධ්‍ය ශිලා යුගයට අයත් ආදි මානවයින් පරිහරණය කළ බවට සාධක හමුවේ. ඔවුන් විසින් දඩයම් කරනු ලැබ පුලුස්සා කැමට ගත් සත්ත්ව ශේෂ, ගොළුවෙලි කවච, තෙල් කැකුණ හා වල් දෙල් කොටස් මේ ගුහාවෙන් හමුවී තිබේ. මානව සැකිලි කොටස් ද හමුවීම භෞතික මානව විද්‍යාත්මකව ඉතා වැදගත්

වේ. රත්නපුර හා ඒ ආශ්‍රිතව මානවයින් වාසය කළ තවත් ගුහා හමුවී ඇතත් බටදොඹ ලෙන වැදගත් වන්නේ එහි ස්ථරයන්ගේ ඉතා නිරවුල්ව පිහිටීම හේතුවෙනි. මෙහි වූ මානවයින් විසින් පුලුස්සා කැමට ගනු ලැබූ සත්ත්ව කොටස් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් හමුවී තිබේ. ඔවුන් අලියාගේ සිට මීයා දක්වා නානාවිධ සතුන් දඩයම් කර ඇති බව පර්යේෂණවලින් පෙනී ගොස් ඇත. නමුත් බටදොඹ ලෙනේ විසූ මානවයා බෙහෙවින්ම ආහාරයට ගෙන ඇත්තේ වදුරන්, රිළවුන්, දඬු ලේනුන්, උගුඩුවන්, කලවාද්දන් ආදී කුඩා සතුන් ද, වලිකුකුළන් හා හබන් කුකුළන් ආදී පක්ෂීන්ද වේ. මීට අමතරව විශාල ප්‍රමාණයේ ලෙහෙල්ලන් ද ආහාරයට ගෙන ඇත.


මේ ගුහාවෙන් හමුවූ අනෙකුත් දෑ අතර මධ්‍ය ශිලා යුගයට අයත් ජනමිතික හැඩයෙන් යුත් ක්ෂුද්‍ර ශිලා මෙවලම් විශේෂ තැනක් ගනියි. මේවා බොහෝවිට තනා ඇත්තේ පළිගුවලිනි. ඉතා සුක්ෂ්මව තනා ඇති මේ ක්ෂුද්‍ර මෙවලම් මෙරට ගල් ආයුධ ඉතිහාසයේ ඉතාමත් දියුණු තාක්ෂණයක් විදහාපායි. මීට අමතරව ගං පතුල්වලින් සොයාගන්නා ලද දළ වශයෙන් අල්ලක් පමණ වූ රවුම් හැඩැති ගල් බටදොඹ ලෙනෙන් හමුවේ. මෙම ගල්වල සිදුරු, විදු තිබීම ඉතා වැදගත් ලක්ෂණයකි. සිදුරු එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් විදින ලද ගල් සුලභව හමුවන අතර පුරා විද්‍යාඥයන්ගේ මතය අනුව මේවා ගිනි මෙලවීම සඳහා උපයෝගී කරගෙන ඇත. එමෙන්ම සතුන්ගේ අස්ථි බිදීම සඳහා මේ හා සමාන ශිලා මෙවලම් භාවිතා කර ඇත. මීට අමතරව සිදුරු

ආදි මානවයා ජීවත් වූ කුරුවිට පිහිටි බටදොඹ ලෙන





අදින් වසර 37,000 කට පමණ පෙර සිට බලංගොඩ මානවයින් (මෙරට විසූ මුල්ම මානවයින්) බටදොඹ ලෙන් විසීය. ඔහු ගිනි මෙලවීමට දරන උත්සාහයක් මෙහි විශාල ප්‍රමාණයෙන් ඇඳ ඇති මානව රූපයෙන් දැක්වේ. ලෙන පුරා විසිරී ඇත්තේ සීය ගල් ආශ්‍රය සහ ඔවුන් ආහාරයට ගෙන ඉව්වල සත්ව අස්ථි කැබලි හා ගොළුවෙල්ලන්ය. මෙම රූපය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත්තේ කැණීම් සාධක පදනම් කරගෙනය.



පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම්වලින් ලැබී ඇති සැකිලි අනුව බලංගොඩ මානවයා රළු ඇති බැම් වැටියක්, කෙටි හා පුළුල් නාසයක්, පුළුල් හා බර යටි හක්කක් සහ පැහැදිලි නිකටක් ඇත්තෙකි. එම සාධක උපයෝගී කොටගෙන බලංගොඩ මානවයාගේ මෙම උඩුකය රූපණය ගොඩනංවා තිබේ.

ද හමුවී තිබේ. ඔවුන් ගින්දර භාවිත කළ ආකාරය හා පවුල් අතර වූ අන්‍යෝන්‍ය සබඳතා පිළිබඳ තතුද මෙහි කළ කැණීම් මගින් අනාවරණය වී ඇත.

පසුගිය සියවසේ මැද භාගයේ පමණ පී.ඊ.පී. දැරණියගල මහතා විසින් බලංගොඩ අසල වලවේ ගං ඉවුරේ බෙල්ලන් බැඳි පැලැස්ස කැණීම් කොට මානව සැකිලි, මෙවලම් හා ඔවුන්ගේ ආහාරවල ශේෂයන් සොයා ගැනීමෙන් පසු 'බලංගොඩ මානවයා' පිළිබඳ සංකල්පය

ගොනාවක් විදින ලද පැතලි ගල් මෙම ගුහාව තුළින් හමුවේ. මේවා කැකුණ ඇට පැලීම සඳහා භාවිත කර ඇති බව පුරාවිද්‍යාඥයන්ගේ විශ්වාසයයි. ඉහත කී ශිලා මෙවලම්වලට අමතරව සත්ත්ව අස්ථිවලින් සාදන ලද උල් හැඩැති මෙවලම් මෙම ගුහාවෙන් සුලභව හමුවේ. එවා ගොළුබෙල්ලන් තුළ ඇති මස් ඉවත් කිරීමටත්, ඊතල හෝ හෙලි තුවාල වශයෙන් භාවිතා කිරීමටත් ඇති බව විශ්වාස කෙරේ. බටදොඹ ලෙනෙන් හමුවන අතිශය වැදගත් උව්‍යයන් අතර සමුද්‍රයේ ජීවත් වන බෙල්ලන් හා මෝර හා මඩු මසුන්ගේ දත් හා ශරීර කොටස් මෙහිලා විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුය. සමුද්‍ර බෙල්ලන්, මෝර මසුන්ගේ දත් පළඳනාවන් ලෙස යොදා ගන්නට ඇති බව විශ්වාස කෙරේ. මේ අනුව බලන කල දකුණු ආසියාවේ ආදිතම මානව වාසස්ථානයක් වූ බටදොඹ ලෙනට ප්‍රාග් ඉතිහාස විෂය තුළ ඉතා වැදගත්කමක් හිමිවන බව කිව යුතුය. බටදොඹ ලෙනේ ජීවත් වූ මානවයා සතු වූ මෘත දේහ වැළඳීම ඇතුළු අභිචාර විධි පිළිබඳ සාධක



ගිනි ඇවිලීම සඳහා යොදා ගන්නා ලදැයි අනුමාන කෙරෙන සිඳුරු විදින ලද රවුම් හැඩැති ශිලා මෙවලම් සහ තැලීමට භාවිතා කරන ලද ශිලා මෙවලම්



සත්ත්ව අස්ථිවලින් නිර්මිත මෙවලම් (මේවා සියල්ලම පාහේ සෙන්ටිමීටර් කෙටි වඩා කුඩා වේ)



මෙය එළිමහන් වාසස්ථානයක තිදු පළිතු හලකින් ආශුබ්‍යයක් හඳුනා බලාගෙන බානවතා දැක්වෙන රූපයකි.
මෙවුන් පරිහරණය කළ පනාමිතික ක්ෂුද්‍ර මෙවලම් කිහිපයක්ද මෙහි වේ.

ප්‍රචලිත විය. ඇත්ත වශයෙන්ම බලංගොඩ මානවයා යනු අප රටේ ජීවත් වූ ආදිතම මානවයා වේ. බලංගොඩ මානවයා යන නම යොදන ලද්දේ ඔහුගේ තනු පළමුවෙන්ම බලංගොඩින් (බෙල්ලන් බැඳිපැලැස්ස) සොයාගත් නිසාය. නමුත් බලංගොඩ මානවයා ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ජීවත් වූ බවට සාධක ලැබෙන බව ආචාර්ය සීරාන් දැරණියගල මහතා පවසයි. කුරුවිට අසල පිහිටි බටතොට ලෙනෙන්ද මේ මානවයා පිළිබඳ සාධක හමුවේ.

ප්‍රාග් ඓතිහාසික කැණීම්වලින් ලද සැකිල හා සැකිලි කොටස් අනුව අපට බලංගොඩ මානවයාගේ භෞතික ස්වරූපය පිළිබඳව යම් අදහසක් ලබාගත හැකිය. පිරිමින්, සෙන්ටිමීටර් 167.8 සිට 173.8 ක්ද (අඩි 5 අඟල් 6 සිට අඩි 5 අඟල් 8 1/4) ගැහැණුන් සෙන්ටිමීටර් 156.3 සිට 165.6 ක්ද (අඩි 5 අඟල් 1 1/2 සිට අඩි 5 අඟල් 4) උසැරිය. පිරිමින්ගේ කපාල ධාරිතාවය ඝන සෙන්ටිමීටර් 1589.72 ක්ද ගැහැණුන්ගේ එය සෙන්ටිමීටර් 919.66 ක්ද වේ. හිස් කබලේ අස්ථි සාපේක්ෂව ඝනකමින් වැඩිය. තලල විශාල හා පුළුල් වේ. යටි හනුව වැද්දන්ට සාපේක්ෂව ශක්තිමත් වන අතර දත් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ. හමු වී ඇති අස්ථි අනුව උඩු හා යටි බාහු වැද්දන්ට වඩා මාංශලම්ය වේ. සමස්ථයක් වශයෙන් ගත් කල බලංගොඩ මානවයා ස්ථුල සිරුරකට හිමිකම් කියූ මානව කොටසක් විය.

2005 වසරේදී බටදොඹ ලෙනේ කැණීම් කළ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා මහතා මෙහි සංස්කෘතික ස්ථරයන්ගේ සීඝ්‍රී බව තවදුරටත් අධ්‍යයනය කළේය. එමගින් දකුණු ආසියාවේ ඉතා වැදගත්ම ආදි මානව ජනාවාසයක්ව පැවති මේ ගුහාව පිළිබඳව කරුණු තවදුරටත් ලොව හමුවේ අනාවරණය විය.



බෙල්ලන්බැඳි පැලැස්සේ විවෘත වාසස්ථාන කැණීමකින් හමු වූ බලංගොඩ මානවයාගේ යටි හකිකක්

ගුහා කැණීමකින් හමු වූ මානව කටි කශේරුකාංක කොටසක්

සමාජනිය

රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත භූමියේ ජීව විද්‍යාත්මක වටිනාකම අප මෙහිදී සුළු වෙන් සාකච්ඡා කළත් ඒ ගැන තවදුරටත් කිව යුතු කරුණු කාරණා බොහෝය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ වනබදු පෙදෙස් අතරින් මේ සා ජීව හා ප්‍රාග් ඓතිහාසික විවිධත්වයක් දරන එකම බිම් පෙදෙස මෙය බව කිව යුතුය. ප්‍රාග් ඓතිහාසික සාධක අතින් දකුණු ආසියාවේ සුවිශේෂීතම ගල් ගුහාව වන බටදොඹ ලෙන මේ කලාපය තුළ පිහිටීම නිසා රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපයේ අගය දෙගුණ තෙගුණ වී ඇතුළුව සැකයක් නැත. කෙසේ වුවත් මානව ජනාවාස වැඩි දියුණු වීම, තේ, රබර් ඇතුළු බෝග වගාව හේතුවෙන් මෙහි වූ වන ආවරණය දිනෙන් දින හිඟිහෙමින් පවතී. අවිචාරවත් අයුරින් කෙරෙන මැහික් ගැරීම ද මේ කලාපයේ ජීව විවිධත්වයට, විශේෂයෙන්ම මිරිදිය මසුන්ට බලවත් තර්ජන ගෙන දී ඇත. මීට අමතරව කෘෂි රසායන භාවිතය නිසා ද ජලජ ප්‍රාණීන්ට මෙන්ම භෞමික සතුන්ට ද හානිකර තත්ත්වයක් උදා වී ඇත. අතිශයින්ම වැදගත් රත්නපුරය හා ඒ ආශ්‍රිත කලාපය ආරක්ෂා කිරීම ශ්‍රී ලාංකිකයින් වශයෙන් අපගේ වගකීම වන බව තරයේ කිව යුතු වන්නේය. ඒ දැනට මෙහි ඉතිරි වී ඇති ස්වාභාවික වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීමට අප අද සිටම කටයුතු නොකළහොත් හෙට දින එම උරුමය සදහටම අපට අහිමි වන හෙයිනි.

ස්තූතිය

වනජීවීන් පිළිබඳවත් සත්ත්ව පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳවත් අධ්‍යයනය කිරීමට බොහෝ සේ උපකාර කළ සුප්‍රසිද්ධ සිට විද්‍යාඥ නැසිතිය පූංචි බණ්ඩා කරුණාරත්න මහතාටත් මාගේ පරයේය. සඳහා සැමදාමත් මා උනන්දු කළ වනජීවී උරුමභාර පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ රෝහාන් පෙරියානොඩ මහතාටත් පොසිල අධ්‍යයනයන් සඳහාත් ප්‍රාග් ඓතිහාසික කැණීම් සඳහාත් මට අවස්ථාව බොදුන් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය සිරාන් උපේන්ද්‍ර දැවණියගල මහතාටත් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කැණීම් හා කෞතුකාගාර අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා මහතාටත් සහ කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය තන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ මහත්මියටත් මාගේ විශේෂ ස්තූතිය පිරිනමමි. එමෙන්ම මේ පොත් පිංච සඳහා පාදාර්ථ ලබාදීමෙන් මෙය වඩාත් සිත්ගන්නා අයුරු නිමකිරීමට උදව් වූ ඇන්ඩ්‍රියස් නොලර්ට්, ආචාර්ය මාධව මීගස්සුකුර, රුචිර සෝමවීර, සුරේශ් බවුට්ට, සමන් ලියනගේ, සුදත් නානායක්කාර, විමුක්ති වීරතුංග යන මහතුන්ටත් වනජීවී උරුමභාර පුද්ගලික සමාගමටත් මාගේ ස්තූතිය පිරිනමමි. මේ කර්තව්‍යය සඳහා මට මුල සිටම දැවැන්ත සහයෝගයක් දැක්වූ සී/ස ඇම්. ඩී. ගුණසේන සහ සමාගමේ එම්. ඒ. තදත් අමත්ද මහතාටත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුඬි පෙරේරා මහතාටත් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජෛව විවිධත්ව ලෙකම් කාර්යාලයේ හසුලා වික්‍රමසිංහ මහත්මියටත් එම ආයතනයේ මනෝජ ප්‍රසන්න මහතාටත් මේ පොත් පිංච මනාලෙස හා කලාත්මක අයුරින් නිමකර මුද්‍රණය කරපුත් සී/ස කරුණාරත්න සහ පුත්‍රයෝ සමාගමටත් මාගේ ස්තූතිය හිමිවේ.



ශ්‍රී ලාංකිකයින් බහුතරයකගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වූ සමනල කන්ද හෙවත් ශ්‍රී පාද කන්ද රත්නපුරය හා නුවරඑළිය පෙදෙස්වල පිහිටා ඇත (SN)

ISBN 978-955-9120-86-5

මුද්‍රණය සී/ස කරුණාරත්න සහ පුත්තලය